



1 Na rozdíl od afrických příbuzných se nosorožec indický vyznačuje jediným rohem, průměrně dlouhým 20 centimetrů. Protože většina jedinců v lidské péči má příbuzné v úspěšném chovu v zoologické zahradě ve švýcarské Basileji, musí být genetická rozmanitost populace v zajetí zvyšována dovozem jedinců z volné přírody.

2 V současnosti OI Pejeta hostí tři z pěti žijících nosorožců Cottonových. Zvířata jsou přísně střežena před pytláky a pravidelně je sledován jejich zdravotní stav.

3 Mezi tradiční chovatele nosorožců dvourohých patří berlínská zoologická zahrada. V říjnu 2014 se v ní narodila hned dvě zdravá mláďata. Zoo vede plemenné knihy pro africké druhy nosorožců.



dvourohého sáhla v roce 1993: na celé obrovské ploše původního areálu rozšíření se ztrácelo ne více než 2 300 exemplářů.

Asijské nosorožce čelí nebezpečí vyhubení ještě déle než jejich afričtí příbuzní. Nejznámější z nich, nosorožec indický (*Rhinoceros unicornis*), se nedá pro svůj vzhled přehlédnout: kůže

4 Početnost nosorožce dvourohého se v období 1960 – 1995 snížila v důsledku pytláctví o plných 98 %. Díky systematické péči včetně opakovaných repatriací dosahuje zmiňovaný licho-koptyník v soukromé rezervaci OI Pejeta ve střední Keni jedné z nejvyšších populačních hustot na celém černém kontinentu. V poslední době čítá jeho tamější populace na sto kusů, přičemž nosná kapacita prostředí dosahuje nanejvýš 120 jedinců.

Stav žijících druhů nosorožců ve volné přírodě a v lidské péči (Khan 1989, IUCN 2015, WWF 2015)

druh	současný areál rozšíření	početnost ve volné přírodě 1970	početnost ve volné přírodě 2015	početnost v lidské péči včetně polochovu 2015
nosorožec indický (<i>Rhinoceros unicornis</i>)	Indie, Nepál	1 200	3 500	174
nosorožec jávský (<i>Rhinoceros sondaicus</i>)	Indonésie (Jáva)	30	35 – 40	0
nosorožec sumaterský (<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>)	Indonésie, Malajsie	536 – 962	80 – 100	10
nosorožec dvourohý (<i>Diceros bicornis</i>)	střední, východní a jižní Afrika	65 000	5 055	240
nosorožec tuponosý (<i>Ceratotherium simum</i>)	jižní Afrika	1 800	19 000	800
nosorožec Cottonův (<i>Ceratotherium cottoni</i>)	ve volné přírodě vyhuben	700	0	5